

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

せき・たんに… フストール シロップ

フストールシロップは「せき」をしすめ「たん」の切れをよくします。

また、甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様からお年寄りまでの服用に適しています。

フストールシロップは「たん」のからむ「湿性のせき」にも有効ですが、特に過剰な「空せき」に効力を発揮します。

睡眠時「せき」が出て眠れない、「せき」により体力が消耗する等、どうしても止めたい過剰な「せき」には、リン酸ジヒドロコデイン（咳中枢を抑制する中枢性鎮咳剤）を配合したフストールシロップが有効です。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 授乳中の人は
(4) 高齢者
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(6) 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人
 高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人
 心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便祕、口のかわき

〔成分・分量〕 本品 100mL中

リン酸ジヒドロコデイン	50mg
d l-塩酸メチルエフェドリン	125mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	450mg
マレイン酸クロルフェニラミン	20mg
無水カフェイン	200mg

添加物として、クエン酸Na、D-ソルビトール、白糖、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を1日3~4回、添付の計量コップにとり服用してください。
なお、場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年令	1回量
成人(15才以上)	10mL
11才以上~15才未満	6.6mL
8才以上~11才未満	5mL
5才以上~8才未満	3.3mL
3才以上~5才未満	2.5mL
1才以上~3才未満	2mL
3カ月以上~1才未満	1mL

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL(06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00