

↓
ビン割れ注意

第3類医薬品

若魁バンカフェ内服液G

若魁
バンカフェ
内服液G

30mL

第3類医薬品

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

使用上の注意

【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれ
た場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この容
器を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
皮膚・発疹・発赤、かゆみ
2. しばらく服用しても症状がよ
くならない場合は服用を中止し、
この容器を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮・虚弱体質、肉
体疲労・発熱性消耗性疾
患・病中病後・胃腸障害
・栄養障害・産前産後な
どの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶
(30mL)を服用してください

成分・分量1瓶(30mL)中
ニンジンエキス200mg(厚生薬
として600mg)/コオウチンキ
0.1mL(厚生薬として1mg)/
トコフェロール酢酸エステル5
mg/チアミン塩化物10mg/リ
ボフラビンリン酸エステルナ

リウム5mg/ピリドキシン塩酸塩
20mg/ニコチン酸アミド20mg
添加物として、D-ソルビトール
、クエン酸、クエン酸Na、バラ
エチレン硬化ヒマシ油、プロピレ
ングリコール、パニコリン、エタノ
ール、エチルパニコリン、グリセリ
ン、香料、白糖、ハチミツ、DL-
リンゴ酸を含有しています

*生薬成分のため濁りを生じ
振ってから服用してください
本剤に配合されているリボ
フラビンリン酸エステルナ
トリウムにより尿が黄色に
なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)服用に際しては、記載事項
をよくお読みください(2)
直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください
(3)小児の手の届かない所
に保管してください(4)使
用期限をすぎた製品は服
用しないでください



製造番号

使用期限 L

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931