

## 鯉肝臓水解物配合

## レバコール®

## 特徴

レバコールは、必須アミノ酸をはじめ、ビタミン及びミネラル等多種類の栄養素を含む新鮮な鯉の肝臓を加水分解したパンリバー末（鯉肝臓水解物）にチアミン硝化物、リボフラビンリン酸エステルナトリウム等を配合した保健栄養剤です。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状               |
|------|-------------------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ         |
| 消化器  | 悪心・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感 |
| その他  | どうき               |

- しばらく服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
軟便、下痢、便秘

## 〔効能・効果〕

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 〔用法・用量〕

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大人(16才以上) | 10mL    | 1回     |
|           | 5 mL    | 2回     |
| 8才以上16才未満 | 5 mL    | 1回     |
| 5才以上8才未満  | 3 mL    | 1回     |
| 5才未満      | 服用しないこと |        |

※添付の計量コップをご使用下さい。

## 〔用法・用量に関連する注意〕

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ピンに直接口をつけて飲まないこと。
- 計量コップに注いだ薬液をピンに戻さないこと。
- 開栓後、味・においに明らかな変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。

(裏面につづく)

**〔成分・分量〕**

1 日量 (10mL) 中

| 成 分                | 含 量   | 成 分   | 含 量   |
|--------------------|-------|---|-------|
| パンリパー末             | 100mg | チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> )                | 10mg  |
| チオクト酸              | 5mg   | リボフラビンリン酸エステルナトリウム<br>(ビタミンB <sub>2</sub> ) | 3mg   |
| パントテン酸カルシウム        | 10mg  |   |       |
| 重酒石酸コリン            | 20mg  | ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )              | 0.5mg |
| イノシトール             | 5mg   | シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )              | 3μg   |
| タウリン               | 30mg  | L-グルタミン酸ナトリウム水和物                            | 15mg  |
| ニコチン酸アミド           | 40mg  | L-トレオニン                                     | 1.5mg |
| グルクロノラクトン          | 5mg   | クエン酸鉄アンモニウム                                 | 30mg  |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 5mg   | ヨクイニンエキス(ヨクイニン煎出液)                          | 3mL   |
| カフェイン水和物           | 10mg  | グリチルリチン酸二アンモニウム                             | 3mg   |

(アルコール0.5mL以下)

添加物としてケイヒチンキ、ショウキョウチンキ、ウイキョウチンキ、チョウジチンキ、サンショウチンキ、サフランチンキ、白糖、D-ソルビトール、滋養糖、クエン酸水和物、コハク酸、ハッカ油、カラメル、安息香酸Na、メタリン酸Na、ポリリン酸Na、パラベン、エタノールを含有します。

**〔成分・分量に関連する注意〕**

- (1) 本剤の服用により、便が黒くなる場合がありますが、クエン酸鉄アンモニウム等の鉄分を含有するためです。
- (2) 本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)を含有するためですから、ご心配ありません。
- (3) 天然物を使用していますので、製品ロットにより多少の色、味、香り等が異なる場合があります。
- (4) 気温や液温等により多少の色、味、香り等が異なる場合があります。

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、できるだけ速やかに服用すること。
- (5) 薬液を添付の計量コップに注いだ後は、ピンの口をよく拭いて清潔にすること。また、使用した計量コップは、その都度、水でよく洗うこと。
- (6) 水およびその他の異物が混入しないように注意すること。

**お問い合わせ先**

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)  
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
製造販売元 牛津製薬株式会社  
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2