ニットーマーゲン内服液

使用上の注意

相談すること

1.次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
　医師の治療を受けている人

2.服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この容器を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
　皮膚：発疹・発赤，かゆみ

3.1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この容器を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

食欲不振（食欲減退），胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ（過食），飲み過ぎ（過飲），胸やけ，もたれ（胃もたれ），胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐

4956 6222

A4OSY

胸やけ，胃のもたれ
二日酔のむかつきに

ニットーマーゲン®

内服液

第2類医薬品

30mL

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
http://www.nippo-yakuhin.jp/
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元 日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
0120-149-931

用法・用量

次の1回量を1日3回，食間に服用してください
成人（15才以上）……1瓶（30mL）

成分・分量　1瓶（30mL）中

オウレンチンキ0.3mL／ケイヒチンキ0.15mL／ショウキョウチンキ0.2mL／ソウジュツ流エキス0.3mL／ゴシュユ流エキス0.3mL／チョウジチンキ0.1mL／キジツチンキ0.3mL／ニンジンエキス30mg
添加物として，l-メントール，安息香酸Na，パラベン，エタノール，カンゾウエキス，ハチミツ，白糖を含有しています
※生薬成分のため濁っていますので，よく振ってから服用してください
　薬効には影響ありません

保管及び取扱い上の注意

1.服用に際しては，記載事項をよくお読みください　2.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください　3.小児の手の届かない所に保管してください　4.使用期限をすぎた製品は服用しないでください

金属：キャップ　ガラス：瓶

製造番号　　使用期限　G