

鼻かぜ(急性鼻炎)

アレルギー性鼻炎

による諸症状の緩和に

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

くしゃみ

鼻みず、鼻づまり

なみだ目…

オムニン鼻炎カプセルS

オムニン鼻炎カプセルSは「鼻かぜ」や「アレルギー性鼻炎」による「くしゃみ」、「鼻みず」、「鼻づまり」、「なみだ目」、「のどの痛み」、「頭が重い」などの不快な症状をやわらげます。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状がある人: 前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

5. 長期連用しないでください。

▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難
- (7) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンソン症候群) 中毒性皮膚壞死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

裏面もお読みください。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘

【他の注意】 母乳が出にくくなることがあります。

【成分・分量】

6カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	主 な 作 用
抗ヒスタミン剤 d-マレイン酸クロルフェニラミン	6.0mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水のアレルギー症状を抑えます。
副交感神経遮断剤 ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁・なみだ液分泌抑制作用により、鼻みず及びなみだ目を抑えます。
消 炎 酵 素 剤 塩化リゾチーム	75.0mg (力価)	抗炎症作用により、鼻粘膜の腫れを抑え、鼻の通りをよくします。
交感神経興奮剤 塩酸ボソイドエフェドリン	120.0mg	鼻粘膜血管収縮作用により、鼻粘膜の充血を控え、鼻づまりを解消します。
カ フ ェ イ ン 剤 無水カフェイン	120.0mg	脳の血管に働き、頭重感をやわらげます。

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有しています。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

【用法・用量】

下記の1回量を食後水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	使用しないこと。	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には 保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方(シートごと飲み込むとのどに突き刺さるなど思ひぬ事故につながることがあります。



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

■ 本品に関するお問い合わせ ■

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00

製造販売元

オール 薬品工業株式会社
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地