



発熱性消耗性疾患・病中病後
肉体疲労・食欲不振などの
栄養補給，滋養強壮に

ラクナル[®]GX

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1回
1瓶(20mL)を1日3回服用する。

〔効能・効果〕滋養強壮，虚弱体質，
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄
養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授
乳期などの場合の栄養補給

〔成分・分量〕1日量3瓶(60mL)中
カンゾウエキス(カンゾウとして5,000mgに相
当)1,250mg リボフラビン 6mg ピリドキ
シン塩酸塩 15mg オロチン酸コリン 174mg
バンテノール 60mg タウリン 2,100mg
添加物として，白糖，D-ソルビトール，
クエン酸水和物，クエン酸Na水和物，安
息香酸Na，ブチルパラベン，エチルアル
コール，グリセリン，バニリン，香料を含
有します。(アルコール0.75mL以下)

発売元 **天野商事株式会社**

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

お客様相談室 052-951-2340

製造販売元 **明治薬品株式会社**

富山県富山市三郷6番地

副作用救済制度 ☎0120-149-931

20mL

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり，副作
用が起こりやすくなる)長期連用しないこと

相談すること

1.次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売
者に相談すること 1)医師の治療を受けている人。
2)妊婦又は妊娠していると思われる人。3)高齢
者 4)次の症状のある人。むくみ 5)次の診断を
受けた人。心臓病，高血圧，腎臓病 2.服用後，次
の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので，直ちに服用を中止し，この製品を持
って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
1)皮膚：発疹，消化器：胃部不快感，悪心等 2)まれ
に下記の重篤な症状が起こることがある。その場
合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドス
テロン症，ミオパチー：手足のだるさ，しびれ，つ
ぱり感やこわばりに加えて，脱力感，筋肉痛があら
われ，徐々に強くなる。3)数日間服用しても症状
がよくなる場合は服用を中止し，この製品を持
って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3.服用後，次の症状があらわれることがあるの
で，このような症状の持続又は増強が見られ
た場合には，服用を中止し，医師，薬剤師又は
登録販売者に相談すること。下痢，便秘
保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たら
ない湿気の少ない涼しい所
に密栓して保管すること。
(2)小児の手の届かない所
に保管すること。(3)他の容
器に入れ替えないこと。(誤
用の原因になったり品質が
変わる。) (4)使用期限を過
ぎた製品は使用しないこと。
※本剤は生薬成分を配合し
た内服液ですので，まれに
沈でんを生じることがあり
ますが，よく振ってから服
用してください。12-2-D

**第2類
医薬品**

使用期限

製造番号

