

服用に際して、この文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬

## ネオゼネル液 - B

第2類医薬品

### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

### 効能又は効果

滋養強壯

虚弱体質

○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

### 用法及び用量

下記の量を1日1回服用して下さい。

年 齢	1 回 量
成人(15才以上)	30mL

(用法用量に関連する注意)

\* 用法・用量を厳守して下さい。

\* 計量容器を添付します

### 成分及び分量

1日量(30mL)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	成 分	分 量
{ニンジン・枸杞子・地骨皮・ 木天蓼・タイソウ} 浸出液	3mL	グルコン酸カルシウム	50mg
		チアミン塩化物塩酸塩(V.B <sub>1</sub> )	10mg
淫洋申浸出液	1mL	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (V.B <sub>2</sub> )	3.2mg
チクセツニンジン浸出液	1mL	ピリドキシン塩酸塩(V.B <sub>6</sub> )	5mg
塩酸リジン	300mg	ニコチン酸アミド(ナイアシン)	20mg
L-トレオニン	15mg	オロチン酸	60mg
グルクロノラクトン	100mg	パントテン酸ナトリウム	30mg
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	50mg	イノシトール	60mg

アルコール 0.9mL以下

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- ( 1 ) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- ( 2 ) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ( 3 ) 他の容器に入れ替えないで下さい。( 誤用の原因になったり、品質が変わります。 )
- ( 4 ) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- ( 5 ) 服用の期間中、瓶の中の液を汚さないよう( 飲みかけのものを瓶にもどす等 ) 注意して下さい。
- ( 6 ) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。

## お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06 - 6352 - 2381

受付時間 : 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1